

ETIKETA

Pomocný prostředek ochrany rostlin

Obchodní název : **PCIT – ECOLURE**

Kombinovaný feromonový dispenzor určený k monitorování lýkožrouta smrkového (*Ips tyographus* L.) a lýkožrouta lesklého (*Pityogenes chalcographus* L.) při ochraně lesních porostů

Účinné látky a jejich obsah v prostředku :

Feromonová směs, obsahující

1. (S)-cis-verbenol 10,0 % hm.
2. chalcogran 1,5 % hm.
3. alkoholy – rozpouštědla 80,0 % hm.
4. synergické komponenty 8,5 % hm.

Evidenční číslo prostředku : 1605 - 2C

Držitel osvědčení o evidenci : FYTOFARM Group s.r.o. Mělník

Distributor v ČR : Fytofarm CZ s.r.o. Mělník, Dlouhá 1360
Mělník 276 01

Výrobce prostředku : FYTOFARM Group s.r.o. Mělník
Dlouhá 1360/28,276 01 Mělník
tel / fax:315 671168



Dráždivý

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Prostředek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci :

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a pryžové holínky.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Zabraňte kontaminaci vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem.

Riziko vyplývající z použití pomocného prostředku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci a při dodržení aplikačních dávek přijatelné pro včely a pro populace všech druhů užitečných členovců.

První pomoc :

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží omyjte množstvím vody.

Balení a obsah :

Jednotlivé kusy

Datum výroby :

Číslo šarže :

Doba použití :

Minimálně jeden rok od data výroby, při dodržení podmínek správného skladování.

Návod k použití :

Rozsah evidence a použití:

Plodina	Škodlivý činitel	Účel použití	Ochranná lhůta
Lesní porosty, smrk	Lýkožrout smrkový (<i>Ips typographus</i>), Lýkožrout lesklý (<i>Pityogenes chalcographus</i>)	monitoring, signalizace náletu,	AT

Termín ošetření: duben až září, proti 1. - 3. generaci, těsně před začátkem rojení, výměna odparníků po 8 týdnech.

Odparníky po uštění alufanové folie v určené spodní části uvolňují pomocí knotu účinnou směs po dobu min. 7 - 8 týdnů. Druhé nastřížení (naříznutí) se může, ale nemusí provést zpravidla po 5 - 6 týdnech v případě potřeby, tj. v případech, kdy je třeba do ovzduší uvolnit větší množství účinné směsi (zvýšené pozadí primárních atraktantů, polomy, vývraty atd.) a při zvýšeném rojení škůdců.

Používají se :

V kombinaci s umělými selektivními lapači např. ECOTRAP, THEYSON atd.

V kombinaci s odvětvovými lapáky nebo jejich výřezy, či sekcemi.

- na zvýšení vábivosti chemicky neošetřených lapáků v smrkových porostech oslabených průmyslovými imisemi, přísuškem, či jinými činiteli.
- na zabránění rozptýlenému napadení nebo vzniku rozsevů ve smrkových porostech s polomy nebo vývraty.
- při aplikaci metody otrávených lapáků ošetřených insekticidní suspenzí.

Umístění lapačů odparníků : Upravuje ON 482711 (obecně doporučujeme)

- bezpečnostní vzdálenost od nejbližšího zdravého smrku nemá klesnout pod 10 m a neměla by překročit 25 m.
- optimální nejmenší vzdálenost mezi lapači se doporučuje 10 m, při vyšších populačních hustotách je výhodnější vzdálenost 5 m.
- při kalamitním stavu se doporučuje umístit lapače ve skupinách v rozstupech 1m.
- sběrné zařízení lapače Ecotrap by mělo být 1m nad zemí.
- umístěte minimálně jeden lapač na 5 ha porostu (monitoring).

Skladování :

Odparníky PCIT - Ecolure skladujte v původních nepoškozených obalech, v suchých a uzamčených skladech odděleně od potravin, hnojiv, krmiv, chemikálií, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě -5 °C až + 10 °C.

Způsob likvidace:

Použité, resp. nefunkční odparníky spolu s obaly likvidujte jako nebezpečný odpad.