

# SANATEX VS

REPELENTNÍ PŘÍPRAVEK S FUNGISTATICKÝMI ÚČINKY K OCHRANĚ LESNÍCH KULTUR PROTI VYTLOUKÁNÍ A K SANACI PORANĚNÝCH STROMŮ.

**CHARAKTERISTIKA:**

SANATEX VS je pasta šedobílé (hnědé) barvy, charakteristického zápuachu, mísitelná s vodou, nehořlavá.

Xn



zdraví  
škodlivý

**ÚČINNÁ LÁTKA/OBSAH:**

2,5% HEXAMETYLENTETRAMIN

**REGISTRAČNÍ ČISLO:** 1532-0

**DRŽITEL REGISTRACE:** TORA, spol. s r.o., Spytihněv

**Označení specifické rizikovosti:**

R 42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

**Standardní pokyny pro bezpečné nakládání:**

S 1 Uchovávejte uzamčené

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 22 Nevdechujte prach

S 23 Nevdechujte aerosoly

S 24 Zamezte styku s kůží

S 37 Použijte vhodné ochranné rukavice.

S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

S 51 Používejte pouze v dobré větraných prostorách

**Standardní věty vyjadřující bezpečnostní pokyny pro ochranu lidí, zvířat nebo životního prostředí:**

SP 1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem

*Nesmí být použito jinak, než je uvedeno v návodu. Může ohrozit zdraví při požití, nadýchaní a styku s pokožkou a sliznicemi. Dopržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.*

**VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ:**

*Přípravek je pro včely relativně neškodný, při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace postříkové kapaliny. Přípravek je považován za nebezpečný pro ryby.*

**SPOTŘEBA:** K sanaci na 1 m<sup>2</sup> max. 0,5 - 1 kg.

**ROZSAH POUŽITÍ:**

Ošetření proti vytloukání zvěří se provádí natíráním nebo nástřikem. SANATEX VS může být aplikován i při teplotě kolem 0°C. Při sanaci poraněných stromů se přípravek aplikuje štětem, kartáčem nebo vhodným postříkovačem.

**BALENÍ:**

SANATEX VS se dodává v plastových kbelících o objemu 10 l a v PE dózách o objemu 1 l a 2,5 l.

**NÁVOD NA POUŽITÍ:**

SANATEX VS se používá zpravidla bez ředění, je mísetelný s vodou, ale zředěním se jeho účinnost podstatně snižuje. Před použitím důkladně promíchat,

- nátr se nanáší štětem nebo dvojitým klešťovitým kartáčem,
- při sanaci poraněných stromů zvěři, mechanickým poškozením při těžbě a úpravách korun stromů se SANATEX VS nanáší na poraněná místa štětem nebo kartáčem, popř. se nastříká – k postřiku jsou vhodné ruční zádrové postříkovače s membránovým čerpadlem a s vířivou tryskou,
- nástřik se aplikuje na lesní kulturu do výše asi 1,5 m tak, aby vznikl uzavřený obal. SANATEX VS se aplikuje dle velikosti stromků, takže jeho spotřeba kolísá od 5 do 15 kg / 1000 ks,
- doporučuje se při plnění postříkovače procedit SANATEX VS sitem postříkovače,
- přípravek může být nanášen i na vlhký podklad při teplotě od +5°C, po nanesení ale musí zaschnout, aby nebyl splaven deštěm.



**LIKVIDACE:**

Prázdné plastové obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru nebo spálí ve schválené spalovně, vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou 1200 – 1400°C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Všechny pomůcky, především postříkovače, musí být ihned po skončení práce důkladně vymyty vodou s přídavkem saponátu nebo 3 %ním roztokem sody a po té čistou vodou. Zaslhlý repellent lze velmi těžko odstranit. Oplachové vody se použijí na přípravu postříkové kapaliny. Případně zbytky oplachové kapaliny nebo postříkové jíchy se vylijí do mělké rýhy na ošetřeném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod. Zbytky přípravku se smísí s hořlavým materiálem (např. dřevěné piliny) a spálí se ve spalovně pro pevné látky.

**SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA:**

SANATEX VS se skladuje v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od 5°C do 30°C, oddělených od skladů s potravinami a krmivy. Při skladování a dopravě nelze palety stohovat. SANATEX VS se přepravuje krytými dopravními prostředky. Při venkovní teplotě pod 0°C musí být SANATEX VS přepravován vozidly vybavenými tepelnou izolací.

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

Při práci s přípravkem SANATEX VS je třeba chránit pokožku, sliznici a oči. K tomu účelu musí být osobní ochranné pracovní prostředky: pracovní oděv např. Unita nebo ekvivalent, gumové rukavice, pracovní obuv a při stříkání obličejový štit např. Š-P 15 + polomaska PROTETIKA typ RU-20 s vložkovým filtrem A1. Při práci s přípravkem SANATEX VS je zakázáno jíst, pit a kouřit. Po skončení práce je třeba umýt ruce vodou a mýdlem, doporučuje se ošetřit pokožku reparačním krémem.

**PRVNÍ POMOC:**

Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím čisté (pitné) vody. Při potřásnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití přípravku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, pokud je postižený při vědomí. Postižený, který požil SANATEX VS nebo má oči zasažené tímto přípravkem, musí být dopraven k lékaři.

**UPOZORNĚNÍ:**

Výrobce bere záruku na kvalitu výrobku ve smyslu pro něho platné podnikové normy. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Při správném skladování je záruční doba 24 měsíců od data výroby.

**OBJEM NÁPLNĚ:** 10 litrů

**DATUM VÝROBY:**  
**ČÍSLO ŠARŽE:**

